

1.

Tétel:

$S$  a koordináta-rendszer síkje:

$P(x_0, y_0, z_0)$  az  $S$  sík egy pontja,  $\underline{n} = (a, b, c)$  pedig  $S$  egy normálvektora.

$Q(x, y, z)$  pont akkor van  $S$  síkban, ha

$$ax + by + cz = ax_0 + by_0 + cz_0$$

Biz:

$$Q \in S \Leftrightarrow \underline{n} \perp \overrightarrow{PQ} = (x - x_0, y - y_0, z - z_0) \Leftrightarrow$$

$$0 = a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) \Leftrightarrow ax + by + cz = ax_0 + by_0 + cz_0$$

- Def: Az  $\underline{n} = (a, b, c)$  normálvektorú  $P(x_0, y_0, z_0)$  ponton átmenő sík egyenlete:  $ax + by + cz = konst.$ , ahol  $konst = ax_0 + by_0 + cz_0$ .

Egyszerűs egyenletrendszer:

$$P(x_0, y_0, z_0) \text{ a } \underline{v} = (v_1, v_2, v_3)$$


$$Q \in e \Leftrightarrow \exists \lambda \in \mathbb{R} : \overrightarrow{OQ} = \overrightarrow{OP} + \lambda \underline{v} \Leftrightarrow (x, y, z) = (x_0, y_0, z_0) + \lambda(v_1, v_2, v_3)$$

$$x = x_0 + \lambda v_1$$

$$y = y_0 + \lambda v_2$$

$$z = z_0 + \lambda v_3$$

$$\lambda = \frac{x - x_0}{v_1} = \frac{y - y_0}{v_2} = \frac{z - z_0}{v_3}$$



/ Ha egy koordinátája 0, pl.  $v_3 = 0$  akkor  $z = z_0$

Ha  $x$  tengellyel párhuzamos, akkor  $\lambda = \frac{x - x_0}{v_1}$   $y = y_0$  és  $z = z_0$  /

Def: A  $V$  halmazon  $\mathbb{R}$  feletti vektorteret mondjuk, ha

$(V, +)$  kommutatív csoport

$\forall u, v, w \in V$  -re igaz:

$$u + (v + w) = (u + v) + w$$

$$u + v = v + u$$

$$\underline{0} \in V : u + \underline{0} = u$$

$\underline{0}$  = nullvektor

$$u + (-u) = \underline{0}$$

Skalárral való szorzásra

$\forall \lambda, k \in \mathbb{R}, \forall u, v \in V$

$$(\lambda + k)u = \lambda u + ku$$

$$\lambda(u + v) = \lambda u + \lambda v$$

$$(\lambda k)u = \lambda(ku)$$

$$1 \cdot u = u$$

Példák:  $\rightarrow \mathbb{R}$  (és minden test) vektorteret önmaga feletti

$\rightarrow f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  típusú függvények  $\mathbb{R}$  feletti vektorteret alkotnak

$$(f + g)(x) := f(x) + g(x) \quad \text{és} \quad (\lambda \cdot f)(x) := \lambda \cdot f(x)$$

nullvektor a 0-függvény, ellentett a  $(-1) \cdot$  szorzás

### 3.

Def: A  $\{b_1, b_2, \dots, b_n\}$  vektorrendszer a  $V$  vektortér bázisa, ha lin. ftlen és  $V$  generátorrendszere.

Tétel: A  $\{b_1, b_2, \dots, b_n\}$  pontosan akkor bázisa  $V$ -nek, ha  $\forall v \in V$  egyértelműen áll elő a  $b_i$ -k lin. komb. jaként.

Biz. Tegyük fel, hogy  $\{b_1, b_2, \dots, b_n\}$  bázis.  $V$  minden vektora előáll lin. komb.-ként, hisz a bázis generátorrendszere. Belátni: lin. komb. felírása egyértelmű

$$v = \sum_{i=1}^n \lambda_i b_i = \sum_{i=1}^n k_i b_i \quad \text{ két különböző felírás$$

$$0 = \sum_{i=1}^n (\lambda_i - k_i) b_i \quad b_i \text{ függetlensége miatt}$$

$$\lambda_i - k_i = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda_1 = k_1, \lambda_2 = k_2, \dots$$

Tegyük fel  $V$  bármely eleme előállítható  $b_1, b_2, \dots, b_n$  lin. komb.-ként generátor rendszerrel alkotandó  $\checkmark$  csak a lin. ftlenség kell bizonyítani: Ha lin. összefüggőek lennének az ellentmondás lenne  $b_i = 1 \cdot b_i$

Def: A  $V$  vektortér dimenziója a  $V$  egy tetszőleges  $B$  bázisának elemszáma

Kicsérélési tétel: Ha  $F = \{f_1, f_2, \dots, f_n\} \subseteq V$  ftlen és  $G = \{g_1, g_2, \dots, g_r\} \subseteq V$  generálja  $V$ -t, akkor tetszőleges  $f_i$ -hez ( $i=1, 2, \dots, n$ ) létezik  $g_j$  ( $j=1, 2, \dots, r$ ) úgy, hogy  $F \setminus \{f_i\} \cup \{g_j\}$  független.

Biz. indirekten  $\exists$  olyan  $f_i$ , amire nem található  $g_j$

$$\text{pl.: } \left. \begin{array}{l} g_1 \text{ sem jó } \{f_1, \dots, f_{i-1}, f_{i+1}, \dots, f_n, g_1\} \text{ lin. of.} \\ \{f_1, \dots, f_{i-1}, f_{i+1}, \dots, f_n\} \text{ lin. ftlen} \end{array} \right\}$$

$$g_1 \in \langle f_1, \dots, f_{i-1}, f_{i+1}, \dots, f_n \rangle$$

$g_2$

$$\text{--- " ---}$$

$$\Rightarrow g_2 \in \langle f_1, \dots, f_{i-1}, f_{i+1}, \dots, f_n \rangle$$

$$\Downarrow g_m \in \langle \text{--- " ---} \rangle$$

$f_1, \dots, f_{i-1}, f_{i+1}, \dots, f_n$  generátor rendszer

$$f_i \in \langle f_1, \dots, f_{i-1}, f_{i+1}, \dots, f_n \rangle$$

$\Downarrow f_1, \dots, f_n$  lin. ftlen.

Köv.: Ha  $f_1, f_2, \dots, f_n$  lin. ftlen és  $g_1, g_2, \dots, g_r$  vektorok generálják  $V$ -t, akkor  $n \leq r$

Biz. a becsereelt  $g_i$ -k mindegyike szükséges, hogy megtartsa  $F$  a függetlenségét

Köv.: Vektortér bármely két bázisa azonos elemszámú.

Biz.:  $B_1$  és  $B_2$  a  $V$  vektortér bázisai

$$B_1 \text{ ftlen és } B_2 \text{ generátorrendszer} \Rightarrow |B_1| \leq |B_2|$$

$$\text{recserélve} \quad |B_2| \leq |B_1|$$



A egy  $n \times n$ -es mátrix

Biz

(1)  $\det(A) = \det(A^T)$

a sorozatos és az inverz is maradandó / főátlóra tükröz

(2) A felsőΔ mátrix,  $\det(A) =$  főátló elemeinek szorzata

(3) A egy sor/osa vagy  $0$   $\det(A) = 0$

(4) " " " "  $\lambda$ -al szorozva a determináns is  $\lambda$  szorzosa lesz (szorzattal szeml. kétség 2-át)

(5) sor/sorlop felcsere a  $\det (-1)$ -szere lesz (minden sorban megváltozik a paritás)

(6) A két sor/sorlop =, a  $\det(A) = 0$  (5)-ös)

(7) A egy sorhoz  $\lambda$ -szorzót hozzáadjunk egy másik sorhoz,  $\det(A)$  nem változik

Kifejtési tétel:

Tetszőleges  $i, j$  esetén teljesül, hogy

Áldetermináns:

pl.:  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 5 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$

$i$  sor szerinti kifejtés:  $\det A = a_{i1} \cdot A_{i1} + a_{i2} \cdot A_{i2} + \dots + a_{in} \cdot A_{in}$

$j$  oszlop szerinti kifejtés:  $\det A = a_{1j} \cdot A_{1j} + a_{2j} \cdot A_{2j} + \dots + a_{nj} \cdot A_{nj}$

$A_{21} = (-1)^{2+1} \cdot \det \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 8 & 9 \end{pmatrix} = -1 \cdot (-6) = 6$

Def: Ha  $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ , akkor összeadhatók, ami elemenkénti összeadást jelent

$(A+B)_i^j = A_i^j + B_i^j$   $A+B = B+A$  kommutatív,  $(A+B)+C = A+(B+C)$  asszociatív

Def:  $A \in \mathbb{R}^{n \times l}$  és  $B \in \mathbb{R}^{l \times n}$  összeszoríthatók  $A \cdot B \in \mathbb{R}^{n \times n}$  sorokból oszlopvektorokból szorzással

általában nem igaz  $A \cdot B = B \cdot A$

$A \cdot (B+C) = A \cdot B + A \cdot C$  és  $(A+B) \cdot C = A \cdot C + B \cdot C$  és  $A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C$

és  $(\lambda A) \cdot B = \lambda(A \cdot B) = A \cdot (\lambda B)$

Determináns szorzattétel:  $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$

$\det(A \cdot B) = \det(A) \cdot \det(B)$  de!  $\det(A+B) \neq \det(A) + \det(B)$

6.

$A \in \mathbb{R}^{n \times n}$

(1)  $(A | \begin{smallmatrix} 1 \\ \vdots \\ 0 \end{smallmatrix})$  lin. egy. rendű egyértelműen megoldható

(2)  $A \cdot x = 0$  " mátrix egyenlet egyértelműen megoldható

(3)  $\begin{pmatrix} \text{---} \\ a_1 \dots a_n \\ \text{---} \end{pmatrix}$  A oszlopai lin. ftlened. egyértelmű megoldás  $\rightarrow \det A \neq 0$   $A^T \begin{pmatrix} || \\ || \end{pmatrix}$

(4)  $\det(A) \neq 0$

(5) A sorai lin. ftlened  $\Leftrightarrow A^T$  oszlopai lin. ftl.  $\Leftrightarrow \det A^T \neq 0 \Leftrightarrow \det A \neq 0$

Lin. egy. rendszer mátrix-al:  $A \in \mathbb{R}^{l \times n}$

1)  $(A|b)$  szimultán egyenletrendszer megoldható van

2) Egyértelműen létezik  $x \in \mathbb{R}^n$  amire  $Ax = b$

3)  $b \in \langle A^1, \dots, A^n \rangle$  és  $\langle A^1, \dots, A^n \rangle$  lin. függetlenek

4)  $\dim \langle A^1, \dots, A^n, b \rangle = \dim \langle A^1, \dots, A^n \rangle = n$

5)  $r(A) = r(A|b) = n$

lineáris transzformáció: azonos tétel közötti lineáris leképezés


Tul.:  $A(\underline{0}) = \underline{0}$  Biz:  $A(\underline{0}) = A(\underline{0} + \underline{0}) = A(\underline{0}) + A(\underline{0})$   
 $\uparrow \quad \uparrow$   $\underline{0} = A(\underline{0})$

Példá: sívektoron az x tengelyre vetítés  
 — " — origó körüli forgatás

8.

Def:  $A: V \rightarrow W$  lin. leképezés

$B = \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$  bázis  $V$ -ben  
 $C = \{c_1, c_2, \dots, c_n\}$  bázis  $W$ -ben



$A$  lin. lek.  $m \times n$  a  $B, C$  bázisok szerint az az  $(m \times n)$ -es  $m \times n$

amelynek  $i$ . oszlopa  $[A(b_i)]_C$

$$A(b_1) = 2c_1 + (-7)c_2 + \dots + 11c_n$$

$[A]_{BC}$   $i$ . oszlopa:  $[A(b_i)]_C$



Tétel:  $A: V \rightarrow W$  lin. lek.

$B = \{ \quad \}$   
 $C = \{ \quad \}$   
 $[A]_{BC}$

$$[A(V)]_C = [A]_{BC} \cdot [V]_B$$

az m-től

Biz.




$$[V]_B = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix} \quad \underline{v} = \lambda_1 b_1 + \dots + \lambda_n b_n$$

$$[A(V)]_C = [A(\lambda_1 b_1 + \dots + \lambda_n b_n)]_C = \dots = [\lambda_1 A(b_1) + \lambda_2 A(b_2) + \dots + \lambda_n A(b_n)]_C =$$

$$= [\lambda_1 A(b_1)]_C + [\lambda_2 A(b_2)]_C + \dots + [\lambda_n A(b_n)]_C = \lambda_1 [A(b_1)]_C + \dots + \lambda_n [A(b_n)]_C$$

Tétel: lin. leképezés sorozata / egymás után alkalmazandó  $\sigma_1$  azokat /  $\sigma_n$  }  $\rightarrow$



$A: U \rightarrow V$   
 $B: V \rightarrow W$  } lin. lek.

$U$ -ban bázis  $A = \{a_1, \dots, a_n\}$  ...


$$[B \circ A]_{AC} = [B]_{BC} \cdot [A]_{AB}$$

$$[B]_{BC} \cdot \underline{\sigma}_i = [B]_{BC} \cdot [A(a_i)]_B \quad \underline{\sigma}_i = A(a_i)$$

|| Tétel

$$[B(A(a_i))]_C = [B \circ A(a_i)]_C$$

$[B \circ A]_{AC}$   $i$ . oszlopa def. szerint





8: Lineáris leképezés szorzata:

$\{v\}$   $A \in \text{Hom}(U, V), \quad B \in \text{Hom}(V, W) \quad B \circ A: U \rightarrow W$

$(B \circ A)(u) := B(A(u)) \quad \forall u \in U$  / egymás után alkalmazandó azelőtt


lineáris leképezés szorzata is lineáris leképezés

lineáris leképezés szorzatának mátrixa azonos a leképezés mátrixainak szorzatával.

Biz: Ha  $u, v \in U$  és  $\lambda \in \mathbb{R}$

$(B \circ A)(u+v) = B(A(u+v)) = B(A(u) + A(v)) =$   
 $= B(A(u)) + B(A(v)) = (B \circ A)(u) + (B \circ A)(v)$

$(B \circ A)(\lambda u) = B(A(\lambda u)) = B(\lambda A(u)) = \lambda B(A(u)) = \lambda (B \circ A)(u)$



$[B \circ A]_{B_3}^{B_1}$  j: oszlopa  $B_1$  bázisbeli  $b_j$  vektor képe  $B_3$  szerinti koordinátáira  
 $(B \circ A)(b_j) = B(A(b_j))$

$[B \circ A]_{B_3}^{B_1} = [B]_{B_3}^{B_2} \cdot [A]_{B_2}^{B_1}$

Tétel:  $M \in \mathbb{R}^{n \times n}, \quad \lambda \in \mathbb{R} \quad \lambda$  s.d.-e  $M$ -nak  $\Leftrightarrow M - \lambda E$   $\lambda E = \begin{pmatrix} \lambda & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda \end{pmatrix}$   
 $\det(M - \lambda E) = 0$

Biz:  $\exists \underline{v} \neq \underline{0} : M \cdot \underline{v} = \lambda \cdot \underline{v}$   
 $M \cdot \underline{v} = (\lambda \cdot E) \underline{v}$

$\exists \underline{v} \neq \underline{0} : (M - \lambda E) \cdot \underline{v} = \underline{0} \rightarrow \left( M - \lambda E \mid \begin{matrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{matrix} \right) \quad Ax = b \Leftrightarrow (A|b)$   
 $(\infty \text{ sor megoldás}) \Leftrightarrow \neq 0 \text{ megoldás}$   
 $\rightarrow \det(M - \lambda E) = 0$

Pl.:

$\begin{vmatrix} 3-\lambda & 7 \\ 0 & 4-\lambda \end{vmatrix} = 0 \quad (3-\lambda)(4-\lambda) - 0 \cdot 7 = 0$   
 $\lambda = 3 \text{ vagy } \lambda = 4$

11.

$\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$

$i^2 = -1$

$z = \underbrace{a}_{\text{Re}(z)} + \underbrace{b \cdot i}_{\text{Im}(z)}$

valós rész      képzetes rész

Algebrai letelek:

$z = a + b \cdot i$

$w = c + d \cdot i$

$z + w = (a + b \cdot i) + (c + d \cdot i) = (a+c) + (b+d) \cdot i$

$z - w = (a + b \cdot i) - (c + d \cdot i) = (a-c) + (b-d) \cdot i$

$z \cdot w = (a + b \cdot i) \cdot (c + d \cdot i) = ac + adi + bci + bdi^2 = (ac - bd) + (ad + bc) \cdot i$

# Pascal

0. sor	$\binom{0}{0}$							
1. sor	$\binom{1}{0}$	$\binom{1}{1}$	1	1				
2. sor	$\binom{2}{0}$	$\binom{2}{1}$	$\binom{2}{2}$	1	2	1		
				1	3	3	1	
				1	4	6	4	1

## Binomiális tétel

$$(a+b)^n = \binom{n}{0} a^n b^0 + \binom{n}{1} a^{n-1} b + \binom{n}{2} a^{n-2} b^2 + \dots + \binom{n}{n-1} a b^{n-1} + \binom{n}{n} a^0 b^n$$

Biz:

$$(a+b)^6 = (a+b)(a+b)(a+b)(a+b)(a+b)(a+b)$$

$$\binom{6}{2} a^2 b^4$$

↳ ahányféle lépésen 6 zárójelből 2 választás (amiből "a"-t választ)

$G = (V, E)$  egyszerű gráf ha  $V \neq \emptyset$  és  $E \subseteq \binom{V}{2} := \{ \{u, v\} : u, v \in V, u \neq v \}$   
 $E$  elemi bizonys sötetelemű részhalmaza.  
 $V(G)$  csúcsok  
 $V(E)$  él

hurokél: 2 végpontja megegyezik

$G$  gráf  $v$  csúcsnál fok a  $v$  végpontú él száma.

Ha  $G$  véges, a fokról álló az él szám kétszerese

teljes gráf: bármely 2 pont össze van kötve (egyszer)

$G$  gráf részgráfja egy olyan gráf, melynek csúcs és él halmazai részhalmazaik  $G$ -nak.

$H$  részgráf ferdített részgráfja  $G$ -nak, ha veszünk  $G$  bizonyos csúcspontjait és minden köztük futó élt. /  $H$  amely 2 csúcsra igaz, legyen szomszédos  $H$ -ben, szomszédos  $G$ -ben

# 13.

$G_1$  és  $G_2$  gráfok izomorfak

létszámosan egyértelmű megfeleltetés a pontok között, úgy, hogy két  $u, v \in V(G_1)$  esetén  $u$ -ból pontosan annyi él vezet  $v$ -be,  $G_1$ -ben, mint  $\varphi(u)$ -ból  $\varphi(v)$ -be  $G_2$ -ben.

$G$  gráf összefüggő, ha bármely 2 pontja között vezet séta.

séta: elborogat, minden élle szelvése

útvonal: séta, kezdőpont = végpont

út: séta, csúcsai szelvése


kör: út, csak a kezdő és végpontja egyezik meg

komponens: ekvivalencia reláció ekvivalenciaosztály

$K \subseteq V(G)$  a  $G$  gráf komponense, ha bármely  $u, v \in K$  között létezik  $G$  séta, de nem létezik  $u-v$  séta ha  $u \in K, v \in V(G) \setminus K$



Def:  $A, B$  halmazok egyenlő számosságúak, ha  $\exists f: A \rightarrow B$  kölcsönösen egyértelmű fr. jele:  $|A| = |B|$   
 Ha  $\exists A \rightarrow B$  injektív, akkor  $|A| \leq |B|$



Cantor - Bernstein tétel: Ha  $|A| \leq |B|$  és  $|B| \leq |A|$   
 akkor  $|A| = |B|$


Def:  $A$  számosságú kisebb, mint  $B$  számosságú /  $|A| < |B|$  / ha  $|A| \leq |B|$  és  $|A| \neq |B|$

$\mathbb{N}: 0, 1, 2, 3, A, \dots$   
 $\mathbb{Z}: 0, 1, -1, 2, -2, \dots$        $|\mathbb{N}| = |\mathbb{Z}|$

Def:  $A$  halmaz megszámolhatóan végtelen, ha  $|A| = |\mathbb{N}|$  jele:  $|A| = \aleph_0$   
 "sorozatba rendezhető"

$|\mathbb{Q}| = |\mathbb{N}|$

Biz.:




$|\mathbb{R}| \neq |\mathbb{N}|$

$\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q} \mid \mathbb{R}$

Def:  $A$  halmaz Számosságú, ha  $|A| = |\mathbb{R}|$  jele:  $|A| = \mathfrak{c}$

Pr.  $|(0, 1)| = |(a, b)|$   
 $a < b$




Cantor tétel:  $|A| < |P(A)|$

Halmazhalmaz:  $P(A) = \{ H \text{ halmaz: } H \subseteq A \}$

$A = \{1, 2, 3\}$      $P(A) = \{ \{1\}, \{2\}, \{3\}, \dots, \{2, 3\}, \dots, \{1, 2, 3\} \}$

$|A| \leq |P(A)|$ :  $f: A \rightarrow P(A)$   
 $x \rightarrow \{x\}$        $|A| \neq |P(A)|$

$x \in A$ :  $x$  kell ha  $x \notin f(x) \subseteq A$   
 $x$  nincs, ha  $x \in f(x) \subseteq A$



$K = \{x \in A: x \text{ kell}\}$

$K \subseteq A, K \in P(A) \Rightarrow \exists \delta \in A: f(\delta) = K$

$\delta \notin \delta \Rightarrow \delta \notin f(\delta) = K \nRightarrow \delta$  "hiányzó"

$\delta$  nincs  $\Rightarrow \delta \in f(\delta) \Rightarrow \delta \in K \nRightarrow \delta$  "felcsúszva"  
 K-ban

$$|P(\mathbb{N})| = |\{0,1 \text{ sorozaab}\}| = |\mathbb{R}| = \mathbb{C} \quad |P(\mathbb{N})|$$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	...
$\{2,4,15\}$	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	...
$\{\text{prime}\}$	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	...
$\{\text{pairs}\}$	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	...

$$\Rightarrow |P(\mathbb{N})| = |\{0,1 \text{ sorozaab}\}|$$

Biz :  $|\{0,1 \text{ sorozaab}\}| \leq |(0,1)| \quad f: \{0,1 \text{ soro}\} \rightarrow (0,1) \text{ inj.}$

$(0, 011101$

$|(0,1)| \leq |\{0,1 \text{ sorozaab}\}| \quad g: (0,1) \rightarrow \{0,1\} \text{ inv. kato}$   
 $x = 0,271$



erdő:  $G$  gráf körmentes  
fa: összefüggő és erdő

Egyenértékjelenség:  $G$  egy  $n$  pontú, körmentes gráf  
akkor összefüggő, ha  $n-1$  élle van  
 $G$  bármely élét elhagyva szétesik  
új élt behúva kör keletkezik

festhető: olyan  $F$  részgráf, amire  $F$  fa és  $V(G) = V(F)$

őf. gráf részgráfja, ami fa, ezed festhető

1.  $G$  összefüggő
2.  $G$  körmentes
3.  $G$ -nek  $n-1$  élle van

minden, legalább 2 pontú  
 $F$  felvétel van legalább 2 élle

14.

Síbarajzolás: síkbeli tartományokra osztás

Tétel:  $G$  gráf pontosan akkor síbarajzolható, ha gömbre rajzolható

Euler formula: Ha egy összefüggő,  $n$ -pontú  $e$ -élű gráf  $t$  tartományal síbarajzolható,  
akkor  $n+t=e+2$

Biz. Ha  $G$  őf., akkor  $t=1$   $n+t=e+1+1=e+2$



Kuratowski-tétel: A  $G$  gráf pontosan akkor síbarajzolható, ha nem tartalmaz  
sem  $K_{3,3}$ -at, sem  $K_5$ -tel topologidusan izomorf részgráfot.

Biz. ha  $G$  sr., akkor minden  $H$  részgráfja sr. Ha  $H$  sr. és  $K$  topologidusan  
izomorf  $H$ -vel, akkor  $K$  is sr. Így  $K=K_5$  ill  $K=K_{3,3}$  nem lehetséges, ha  
 $G$  sr. völd.

Legyen  $G=(V,E)$  síbarajzolható gráf, legyen  $V^*$   $G$  lapjainak halmaza.

$G^*=(V^*,E^*)$  a  $G$  duálisa, ahol  $E^*=\{e^* : e \in E\}$  és  $e^*$  az  $e$ -t határoló  
tartományokat összekötő él.

Pl.




$$\frac{z}{w} = \frac{(a+bi)(c-di)}{(c+di)(c-di)} = \frac{(ac+bd) + (bc-ad)i}{c^2+d^2} = \frac{ac+bd}{c^2+d^2} + \frac{bc-ad}{c^2+d^2} \cdot i$$

Hossz  $|z|$  a  $z$  komplex szám távolsága az origótól

$$z = |z| \cdot (\cos \alpha + i \cdot \sin \alpha)$$

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$



Def:  $z = a + bi$  konjugáltja:  $\bar{z} = a - bi$   
 $|z|^2 = z \cdot \bar{z} = (a+bi)(a-bi) = a^2 + b^2$

Művelet trigonometrikus alakban:  $z = r(\cos \varphi + i \cdot \sin \varphi)$   $w = s(\cos \mu + i \cdot \sin \mu)$

$$z \cdot w = r \cdot s \cdot (\cos(\varphi + \mu) + i \cdot \sin(\varphi + \mu))$$

$$\frac{z}{w} = \frac{r}{s} \cdot [\cos(\varphi - \mu) + i \cdot \sin(\varphi - \mu)]$$

$$z^n = r^n [\cos(n \cdot \varphi) + i \cdot \sin(n \cdot \varphi)]$$

pl.:  $(\sqrt{3} - i)^{300} = [2(\cos \frac{5\pi}{6} + i \cdot \sin \frac{5\pi}{6})]^{300} = 2^{300} (\underbrace{\cos \frac{250\pi}{6}}_1 + i \cdot \underbrace{\sin \frac{250\pi}{6}}_0) = 2^{300}$

n-edik gyöke:

$$\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{r} \left[ \cos\left(\frac{\varphi}{n} + k \cdot \frac{2\pi}{n}\right) + i \cdot \sin\left(\frac{\varphi}{n} + k \cdot \frac{2\pi}{n}\right) \right] \quad k = 0, 1, 2, \dots, n-1$$

pl.:  $\sqrt[3]{1} = \sqrt[3]{1} \left[ \cos\left(\frac{0}{3} + k \cdot \frac{2\pi}{3}\right) + i \cdot \sin\left(\frac{0}{3} + k \cdot \frac{2\pi}{3}\right) \right] \quad k = 0, 1, 2$

$$1 \cdot (\cos 0 + i \cdot \sin 0) = 1$$

$$1 \cdot (\cos \frac{2\pi}{3} + i \cdot \sin \frac{2\pi}{3}) = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

$$1 \cdot (\cos \frac{4\pi}{3} + i \cdot \sin \frac{4\pi}{3}) = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

n-edik egységgyök:  $\sqrt[n]{1}$

$$\cos\left(k \cdot \frac{2\pi}{n}\right) + i \cdot \sin\left(k \cdot \frac{2\pi}{n}\right) \quad k = 0, \dots, n-1$$

12.

ismétlés nélküli variáció:  $V(n, k) = n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (n-k+1)$  Hány befutó?

factorialis:  $n!$

permutáció / sorbarendelés

ismétléses variáció

$n^k$

ismétléses permutáció:

$$\frac{n!}{k_1! \cdot k_2! \cdot \dots}$$

ombináció:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)! \cdot k!}$$

pl: kombináció:  $C(n, k)$

Egyenlő összefüggés:

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$$



A lineáris leképezést egyértelműen meghatározzák a báziselemek képei.


Pontosabban: Ha  $U$  és  $V$  valós vektortér, az  $u_1, u_2, \dots, u_n$  vektorok az  $U$  bázisát alkotják és  $v_1, v_2, \dots, v_n$  tetszőleges  $V$ -beli vektorok, akkor pontosan egy olyan  $A \in \text{Hom}(U, V)$  lineáris leképezés létezik, amire  $A(u_i) = v_i$   $\forall i$ .

9.

Def:  $A: U \rightarrow V$  lineáris leképezés

magtere:  $\text{Ker } A := \{ u \in U : A(u) = \underline{0} \}$   $U$ -beli vektorok amik a  $V$  nullvektorba képeződnek

képtere:  $\text{Im } A := \{ A(u) : u \in U \}$  előállnak  $U$ -beli vektorok képeiből



Példák:  $x$  tengelyre vetítésnél képtér az  $x$ , magter az  $y$  tengely  
origón áthaladó tengelyre tükrözésben a képtér a teljes sík, magter pedig az origó térf.

Dimenziótétel:  $\dim \text{Im } A + \dim \text{Ker } A = \dim U$   $U \rightarrow V$   
 $\dim U$  véges

Biz:  $B' := \{ b_1, b_2, \dots, b_l \}$  a  $\text{Ker } A$  vektoraiban egy bázisa

$B'$  független az  $U$  vektortérben  $\rightarrow U$  bázisa  $B = \{ b_1, b_2, \dots, b_l, b_{l+1}, \dots, b_n \}$

$\dim \text{Ker } A = l$  és  $\dim U = n$

igazolni:  $\dim \text{Im } A = n - l$

megmutatni:  $A(b_{l+1}), A(b_{l+2}), \dots, A(b_n)$  vektorok az  $\text{Im } A$ -ben egy bázisa  
ezt a vektorok generálnak minden  $\text{Im } A$ -beli vektort + függetlenek?

$A(u)$  a képtér egy tetszőleges vektora

$u = \sum_{i=1}^n \lambda_i b_i$   $u$  előállítás a  $B$  bázisban

$A(u) = A(\sum_{i=1}^n \lambda_i b_i) = \sum_{i=1}^n \lambda_i A(b_i) = \sum_{i=l+1}^n \lambda_i A(b_i)$

mind  $A(b_1) = A(b_2) = \dots = A(b_l) = \underline{0} \Rightarrow$  generátorrendszer

$u := \sum_{i=l+1}^n \lambda_i b_i \in \text{Ker } A$

$u = \sum_{i=1}^l \mu_i b_i = \sum_{i=l+1}^n \lambda_i b_i$

$\lambda_{l+1} = \lambda_{l+2} = \dots = \lambda_n = 0 \Rightarrow$  a rendszer független  $\Rightarrow \text{Im } A$ -ben bázis

10.

$A: V \rightarrow V$  lin. transzformáció  $A(v) = \lambda \cdot v$

$v \neq \underline{0}$  sajátvektora  $A$ -nak, ha  $A(v) = \lambda \cdot v$  (omlyan  $\lambda \in \mathbb{R}$ -re)

$\lambda \in \mathbb{R}$  sajátértéke  $A$ -nak, ha  $A(v) = \lambda \cdot v$  omlyan  $v \neq \underline{0}$ -ra

Def:  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ,  $v \in \mathbb{R}^n$  egy oszlopvektor, és  $\lambda \in \mathbb{R}$  egy skalar.  $A$   
 $v$  az  $A$   $n \times n$   $\lambda$  sajátértékhez tartozó sajátvektorának mondjuk, ha  
 $v \neq \underline{0}$  és  $A \cdot v = \lambda \cdot v$

Def:  $B^n$  egy  $n \times n$ -es mátrix az  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$  mátrix balinverze, ha  $B \cdot A = I_n$   
 $A \cdot B = I_n$   $I_n =$  egységmátrix  $\begin{pmatrix} 1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & 1 \end{pmatrix}$

Ha  $B = B \cdot I_n = B \cdot (A \cdot B) = (B \cdot A) \cdot B = I_n \cdot B = B$

Def:  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$   $A$ -nak az  $X \in \mathbb{R}^{n \times n}$  mátrix inverze, ha  $A \cdot X = E = X \cdot A$   
 felt:  $X = A^{-1}$   $\exists A^{-1} \Leftrightarrow \det A \neq 0$

Biz:  $A \cdot X = E$  / det

$$\det(A \cdot X) = \det E$$

$$\det A \cdot \det X = 1$$

$$\det A \neq 0$$

$$\left( A \left| \begin{array}{c} 1 \dots 0 \\ \vdots \\ 0 \dots 1 \end{array} \right. \right) \Rightarrow \text{Gauss-eliminációs sorozat} \left( \begin{array}{c|c} 1 \dots 0 & X \\ \hline 0 \dots 1 & A^{-1} \end{array} \right)$$

$\det(A) \neq 0$

7.

Def:  $A$  oszlop-rangja/sor-rangja  $r$ , ha  $A$  oszlopai/sorai lineárisan függetlenek, de  $(r+1)$  már nem. felt:  $s(A) / \sigma(A)$

Def:  $A$  determináns-rangja  $r$ , ha  $A$ -ból választható  $r \times r$ -es nemnulla determinánsú négyzetes részmátrix, de  $(r+1) \times (r+1)$ -es nem. felt:  $d(A)$

Tétel:  $\sigma(A) = s(A) = d(A) = r(A)$  !

Biz:  $s(A) = \sigma(A^T) = d(A^T) = d(A) = \sigma(A)$

1) négyzetes mátrixoknál  $\det(A) = \det(A^T)$

2)  $s(A) = d(A)$  mert  $\sigma(A) = \dim \langle A^1, A^2, \dots \rangle = \dim \langle (A^T)_1, (A^T)_2, \dots \rangle = s(A^T) = d(A^T) = d(A) = s(A)$

3)  $r(A) \rightarrow$  vezéregyenes sávszám,  $\sigma(A) \geq r$  vezéregyenes sávszám

$\sigma(A) = r \Leftrightarrow \sigma(A) \leq r$   $\mathbb{R}^2$ -ben nincs  $r$ -nél több lin. f. ten. oszlopvektor

$r(A)$  meghatározása: Gauss-elim., RLA-Son vezéregyenes sávszám

$A \xrightarrow[\text{elemi sorvevőműveletek/ESA}]{\text{Gauss-elimináció}} A'$   
 / elb. ill. lin. sorok száma /

$\Rightarrow A'_1, A'_2 \in \langle A_1, A_2, \dots \rangle \quad \langle A' \rangle \subseteq \langle A \rangle$   
 $A_1, A_2 \in \langle A'_1, A'_2, \dots \rangle \quad \langle A \rangle \subseteq \langle A' \rangle$   
 $\Rightarrow \langle A \rangle = \langle A' \rangle$   
 és  $s(A') = s(A)$

$$r(A) = \dim \langle a_1, a_2, \dots, a_n \rangle$$

Def: Ha  $U, V$  valós vektortérrel szerelt habs  $A: U \rightarrow V$  függvény egy lin.

leképezés, ha

①  $A(u+v) = A(u) + A(v) \quad \forall u, v \in U$

②  $A(\lambda u) = \lambda A(u) \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall u \in U$



#### 4.

Def.: lépcsős aladálnak nevezzük egy egyenlhetőségi mátrixot, ha

- 1) minden sorában az első nemnulla elem 1 (vezéregyes)
- 2) bármely vezéregyese igaz, h detérióleges felette álló sorban van a vizsgált vezéregyestől balra vezéregyes

Def.: lépcsős aladálnak a vezéregyest fölött is 0-1 állnak, = redukált lépcsős alad egyértelműen megoldható, ha csak 1 megoldása van azokat az ismeretleneket, melyekhez nincs az oszlopban vezéregyes, szabad paramétereknek nevezzük. Ha a főátló oszlopban van vezéregyes, dílos sorokat nevezzük.

Elemi sorrelváltak átalakításai:

- (1) két sor felcserelése
- (2)  $\lambda \neq 0$  végigszorzása egy sorral
- (3) 2 sor elemenkénti összeadása
- (4) vagy 0 sor elhagyása

} lin. egyenl. megoldáshalmaza nem változik

- Gauss-elimináció:
1. Ha  $M^A = \underline{0}$  elhagyjuk
  2. E-jel el, hogy  $M_{11} = 1$  legyen
  3. Szüntessük az 1-n alatti elemeket
  4. sor<sup>ok</sup> elhagyása, g-e. a főátló sorra

lin. egy. akkor oldható meg, ha a (redukált) lépcsős aladja nem tartalmaz dílos sort. A szabad paraméterek értékeit detérióleges megvalósításához létezik egyértelmű megoldása.

lin. egy. létezik és egy. megoldása van, ha legalább annyi egyenlet van mint ahány ismeretlen.

#### 5.

permutáció: kölcsönös leképezés / függvény ami 1 és n közötti számok mindegyikét 1 és n közötti számra rendel úgy, hogy minden 1 és n közötti szám pontosan egy másod számhoz van hozzárendelve.

$i, l$  elemek inverzióban állnak, ha  $\sigma(i) > \sigma(l)$  és  $i < l$  elemek nagyságrendje fordított inverzióban az inverzióban álló számpárok száma

Def.: determinans: összes bástyaelhelyezés véletli sorrendben a megfelelő  $\pm$  előjellel összeadva

Köv. (1)  $\lambda \cdot \underline{0} = \underline{0}$

Biz.  $\underline{0} = \underline{0} + \underline{0}$   
 $\lambda \cdot \underline{0} = \lambda(\underline{0} + \underline{0}) = \lambda \cdot \underline{0} + \lambda \cdot \underline{0} \quad | + -(\lambda \underline{0})$   
 $\underline{0} = -(\lambda \underline{0}) + \lambda \underline{0} = \lambda \cdot \underline{0}$

(2)  $0 \cdot v = \underline{0}$

$0 = 0 + 0$   
 $0 \cdot v = (0 + 0)v = 0v + 0v \quad | - (0 \cdot v)$   
 $\underline{0} = 0v$

(3)  $(-1)v = -v$

$\underline{0} = 0v = (1 - 1)v = v + (-1)v \quad | -v$   
 $-v = -v + \underline{0} = -v + (v + (-1)v) = (-v + v) + (-1)v$   
 $-v = \underline{0} + (-1)v = (-1)v$

(4)  $\lambda \cdot v = \underline{0}$   
 $v = \underline{0}$

ha  $\lambda = 0$  vagy Tegyük fel hogy:

$\lambda \cdot v = \underline{0}$  és  $\lambda \neq 0$

$\underline{0} = \frac{1}{\lambda} \underline{0} = \frac{1}{\lambda} (\lambda \cdot v) = \left(\frac{1}{\lambda} \lambda\right) v = v$

## 2.

Def: A  $W \subseteq V$  részhalmaz a  $V$  valós vektortér altérje, ha  $W$  is valós vektortér a  $V$  vektortér műveleteire. Jele:  $W \leq V$

$W$  altér ha  $\Leftrightarrow$  (1)  $u, v \in W \Rightarrow u + v \in W$   
(2)  $v \in W \Rightarrow \lambda \cdot v \in W \quad \forall u, v \in V, \forall \lambda \in \mathbb{R}$

Def: Legyen  $V$  valós vektortér. A  $v_1, v_2, \dots, v_n$  vektorok lineáris kombinációja a  $\sum_{i=1}^n \lambda_i v_i = \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_n v_n$

generált altér = generátuma jele:  $\langle u_1, u_2, \dots, u_k \rangle$

Def:  $v \in V$  vektort generálja a  $V$  vektortér  $U$  részhalmaza, ha  $v$  előáll  $U$  véges sok vektorának lineáris kombinációjából.

$v = \sum_{i=1}^n \lambda_i u_i$

$\langle U \rangle = U$  részhalmaz generált vektorok halmaza

Def:  $U$ -t a  $W$  generátorrendszerének hívjuk, ha

$U \subseteq V$  halmaz generálja a  $W \leq V$  altérrel, ha minden vektort generálja, azaz ha  $W \subseteq \langle U \rangle$ , ezentúl  $U \subseteq W$  is teljesül.

Lineáris függetlenség:  $v_1, v_2, \dots, v_n$  vektorrendszer lin. független, ha csak a triviális lineáris kombinációjuk áll elő a  $\underline{0}$ -t

/egyik  $v_i$  sem áll elő a maradék vektorok lineáris kombinációjából/